

pantovigar® N

Pharmazeutischer Unternehmer
GEORG SIMONS GMBH
Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt
Tel. 069/15 03-1 Fax 069/15 03-830
Ein Unternehmen der MERZ-Gruppe

Hersteller
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt
Telefon: 069/15 03-1, Telefax: 069/5 96 2150

Anwendungsgebiete
Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei diffusem Haarausfall und brüchigen Fingernägeln.

Gegenanzeigen
Wann dürfen Sie Pantovigar N nicht anwenden?
Bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen seiner Bestandteile soll Pantovigar N nicht angewendet werden.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Sucrose (Zucker) ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden erblichen Fructose-Unverträglichkeit (hereditäre Fructose-Intoleranz), einer Glucose-Galactose-Malabsorption oder einem Saccharose-Isomaltase-Mangel.

Was müssen Sie in der Stillzeit beachten?
Wenn Sie stillen, sollten Sie Pantovigar N nur nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise
Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?
Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegenden, kann die Einnahme von Pantovigar N in der Schwangerschaft nicht empfohlen werden.

Wechselwirkungen
Was müssen Sie beachten, wenn Sie zusätzlich andere Arzneimittel anwenden?
Es sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung
Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Pantovigar N nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Pantovigar N sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel von Pantovigar N und wie oft sollten Sie Pantovigar N einnehmen?
3 x 4 überzogene Tabletten täglich einnehmen.

Wie und wann sollten Sie Pantovigar N einnehmen?
Täglich zu den Hauptmahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Wie lange sollten Sie Pantovigar N einnehmen?
Die mittlere Behandlungsdauer liegt bei 3–6 Monaten. Die Behandlung kann im Bedarfsfalle fortgesetzt oder wiederholt werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung
Was ist zu tun, wenn Pantovigar N in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?
Überdosierungserscheinungen sind bisher nicht bekannt.

Nebenwirkungen
Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Pantovigar N auftreten?

In Einzelfällen sind Unverträglichkeitsreaktionen wie Schweißausbrüche, beschleunigter Puls, Hautreaktionen mit Juckreiz und Nesselsucht bekannt geworden. Außerdem können unter der Anwendung Magen-Darm-Beschwerden (z.B. Aufstoßen, Übelkeit, Blähungen, Magenschmerzen) auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?
Bei auftretenden Nebenwirkungen ist das Präparat abzusetzen und gegebenenfalls ein Arzt aufzusuchen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels
Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Faltschachtel und Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Pantovigar N aufzubewahren?
Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel, für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information
Februar 2004

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung

1 überzogene Tablette enthält:

<i>Arzneilich wirksame Bestandteile</i>	
Thiaminnitrat	15,00 mg
Calciumpantothenat	15,00 mg
L-Cystin	5,00 mg
Keratin	5,00 mg
Trockenhefe aus <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	25,00 mg

Sonstige Bestandteile

Povidon, mikrokristalline Cellulose, Talkum, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Gelatine, Sucrose (Saccharose), Macrogol, Schellack, gebleichtes Wachs, Carnaubawachs, Farbstoffe (E 171, E 172)

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 300 und 1200 überzogenen Tabletten.

Pantovigar N ist auch als Kapsel erhältlich. Für Diabetiker ist besonders die Kapselform geeignet.

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise
Traditionelles Arzneimittel